

PERSBERICHT – NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) pleit voor gedegen aanpak en samenwerking in de tongriemproblematiek.

Naar aanleiding van het recente Nieuwsuur-item over tongriembehandelingen, uitgezonden op 31 januari, wenst de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) haar perspectief op deze kwestie te delen.

In het programma uiten kinderartsen hun zorgen over het kliefen van tongriemen bij baby's die niet goed drinken aan de borst. Volgens hen wordt dit zogenaamde doorknippen van de tongriem in veel gevallen onnodig gedaan. De kinderartsen waarschuwen voor medische risico's.

Erkennen zorgen van kinderartsen

Als vertegenwoordiger van lactatiekundigen erkent de NVL de zorgen die zijn geuit door de kinderartsen en pleiten wij voor zorgvuldige aanpak en samenwerking in de behandeling van tongriemproblematiek.

Rol lactatiekundigen

Lactatiekundigen ondersteunen moeders met baby's die o.a. niet goed aan de borst kunnen drinken. Hierbij wordt samengewerkt met verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, en andere gezondheidswerkers om een holistische zorgaanpak te bieden aan moeders en baby's. Cruciaal om te benadrukken is dat lactatiekundigen zelf geen tongriembehandelingen uitvoeren.

Samenwerking en kwaliteit van zorg

Binnen de medische sector zijn verschillende professionals bevoegd tot het uitvoeren van frenulotomie (tongriem behandeling), waaronder verloskundigen, kinderartsen, plastisch chirurgen, KNO-artsen en tandartsen. Deze diversiteit in uitvoerders benadrukt de noodzaak van multidisciplinaire samenwerking en continue aandacht voor kwaliteit.

Helaas is lactatiekunde vaak onderbelicht binnen medische opleidingen, zelfs in specialismen zoals verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde. Wij zijn van mening dat dit leidt tot variatie in de kwaliteit van anamnese, beoordeling en behandeling van tongriemproblematiek, afhankelijk van individuele interesse en expertise.

Ouders zoeken helaas vaak hun toevlucht tot mogelijk minder effectieve oplossingen, die door veel zorgverleners worden aangeboden, maar niet door lactatiekundigen.

Belang van multidisciplinaire samenwerking

De NVL pleit voor een grondige anamnese van de voedingssituatie, inclusief de observatie van zowel moeder als baby tijdens de borstvoeding. De beoordeling van een eventuele tongriemproblematiek vereist zowel anatomisch als functioneel onderzoek, met aandacht voor differentiaaldiagnostiek en het sociale systeem rondom de baby.

Een tongriembehandeling vormt geen snelle oplossing voor voedingsproblemen. Nazorg en begeleiding zijn vaak noodzakelijk, waarbij lactatiekundigen een centrale rol spelen bij borstvoeding en pre-verbaal logopedisten bij flesvoeding.

Overwegingen bij verplichte verwijzing:

Het voorstel van de vereniging van kindergeneeskunde om verplichte verwijzing door kinderartsen in te stellen, vereist volgens ons verdere discussie en afstemming. Momenteel ontbreekt het aan de juiste randvoorwaarden om de uitvoering van frenulotomie adequaat te begeleiden.

Open voor dialoog en samenwerking

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen staat open voor dialoog en samenwerking om de kwaliteit van zorg rondom tongriembehandelingen te optimaliseren. Wij blijven ons inzetten voor een holistische aanpak waarbij de behoeften van moeder en baby centraal staan.